

レナリドミド

カプセル2.5mg/5mg「F」

LENALIDOMIDE capsules

1回量パック 使用方法

カプセルのセットの仕方

1 各記入欄に必要事項を記入します。


1回量パックの表面には、患者さんの情報（「患者氏名」「服用日」「MEMO」）を記入する欄を設けております。また、裏面には、「担当薬剤師」「配薬担当看護師」「配薬確認看護師」の氏名を記入する欄を設けております。

◆フルネーム確認

1回量パックの「患者氏名」欄に、患者さんの「姓」と「名」を記入することで、与薬時にフルネーム確認が行えます。また、服用日を記入することで、投与日の誤認も防げます。同姓同名の患者さんがいるなど、配薬・与薬時の注意事項を記入する場合は、「MEMO」欄をご利用ください。


◆ダブルチェック

誤投与事例の多くは、夜間などで人手が不足しているときに起こっています。より確実に配薬を行い、誤投与を防止するためには、必ずダブルチェックを行ってください。ご施設の運用にあわせてご利用ください。




2 1回量パックを裏返し、PTPシートの凸部を下にして、カプセルが○の穴に収まるようにセットし、①を折り畳みます。

薬剤はPTPシートから出さずにセットします。




3 ②～④の順に折り畳みます。

表面にあるグレーの部分が隠れるように②・③を折り畳みます。



4 折り畳んだら⑤の突起を差し込みます。



1回量パックの表面からカプセルを押すと、薬剤を取り出せます。

- 1回量パックからカプセルを取り出したときに飛び出さないように、裏面にフタがついています。薬剤をセットする際に切り取らないようにしてください。
- 1回量パックは使い捨てです。



1回量パック 使用における お願い

1回量パックとは、薬剤師や看護師が、レナリドミドカプセル「F」を処方された入院患者さんに、1回分の用量をセットして配薬するためのものです。

- 患者さんが服用する1回分の薬剤をセットしてください。
- レナリドミドカプセル「F」は催奇形性のある薬剤です。薬剤を取り扱う方々に注意喚起を行ってください。
- 1回量パックに患者さんの氏名、薬剤師や看護師の氏名を記入し、配薬・与薬時に「ダブルチェック」「フルネーム確認」を行ってください。